

# 片麻痺評価チャート

検査者

評価日 年 月 日

ID	氏名	年齢 歳	性別 男女	利き手 右 左
----	----	------	-------	---------

## 他部門からの情報

発症日 年 月 日 CT・MRI所見	主治医からの情報	看護部門からの情報
-----------------------	----------	-----------

## 理学療法評価

BP( / ) 降圧剤(-・+)	PT評価前( /m ) 整・不整( )分	PT評価後( /m ) 整・不整( )分	自覚症状(-・+)
意識障害 (-・+)	3.3.9度法( )	夜間譫妄(-・+)	不眠(-・+)
失語症 (-・+)	motor impersistence(-・+)		
失行 (-・+)			
失認 (-・+)	半側空間失認(-・+)		
痴呆 (-・+)	長谷川テスト( )点 (重・中・軽)		
他の精神症状 (-・+)	感情失禁・意欲なし・依存的・わがまま・抑制欠如・不注意		
頸部 異常 (-・+)	項部硬直 筋強剛 ROM制限		
著明な筋萎縮 (-・+)			

## 筋緊張

上肢	大胸筋	肘 屈曲	前腕 回内	手 屈筋	手指 屈筋
		伸展	回外	伸筋	伸筋
下肢	膝 屈筋	膝clonus (-・P・+)	足 背屈筋	足clonus (-・P・+)	
	伸筋		底屈筋		

健側異常(-・+) 小括: rigidospastic spastic normal quasi-flaccid flaccid

## ROM制限: 麻痺側 痛みはPと記入

肩 屈曲	肘 屈曲	前腕 回内	手 背屈	手指 屈曲
外転	伸展	回外	掌屈	伸展
外旋				


股 屈曲	膝 屈曲	健側異常(-・+)
S L R	伸展	他の著明な制限(-・+): 外反母趾 槌指 膝引出し現象 円背
伸展	足 背屈	肩の異常(-・+): 肩手症候群(stage . . . )
外転	底屈	亜脱臼(無痛・有痛)
内転		他の疼痛(-・+)

## 感覚: 閉眼で検査

触覚(筆)異常 (-・+)	低下・過敏( /10): 上肢・下肢・体幹・顔 Extinction(-・+)
痛覚(ピン)異常 (-・+)	低下・過敏( /10): 上肢・下肢・体幹・顔
位置覚異常 (-・+)	母指・母趾
他動運動覚異常 (-・+)	上肢( ): 肩( ) 肘( ) 前腕( ) 手首( ) 下肢( )
振動覚異常 (-・+)	橈骨結節(右・左)で軽・中・消失 内顆(右・左)で軽・中・消失
指先認知異常 (-・+)	

他(2点識別覚・手掌描字覚):

## 反射

	他の神経症状(-・+): 振戦 痙攣 失調
	排泄障害(-・+): 失禁(尿・便)(常時・時々・夜間) 尿閉 パルーン(-・+)
	皮膚症状(-・+):
	足背動脈の触知: 右(-・+) 左(-・+)
	肥満 るいそう 白内障 難聴 歯の異常 骨折(部位: 受傷: )

片麻痺機能テスト (十分) (不十分) ×(不可能) ( )は十分の最低限

上肢stage( )		下肢 stage( )	
1	臥位	1	臥位
2	連合反応 (大胸筋)	2	レイミスト (股内転)
3	随意運動 (大胸筋)	3	随意収縮 (股内転)
4	伸筋共同運動 (臍)	3	随意共同運動 (膝伸展20°)
5	屈筋共同運動 (乳頭)	4	随意共同運動 股屈曲90°
6	手を背中の後へ(脊柱より5cm)	5	下肢伸展挙上 (30°)
7	腕を前方水平位に挙上(60°)	6	座 膝関節の屈曲 (100°)
8	肘屈曲位で前腕の回内(50°)	7	位 足関節を背屈 (5°)
9	肘伸展位で腕を横水平位に開く(60°)	予1	臥 膝伸展位で股関節の外転(5°)
10	腕を前方上方に挙上 (130°)	予2	座 膝伸展 (30°)
11	肘伸展位で回外 (50°)	8	座 足関節の背屈 (5°)
予1	手を肩から頭上に挙上 1.5倍 (健 秒・患 秒)	9	座 膝伸展位で股関節の外転(5°)
	腕を横水平に挙上	10	位 股関節内旋 (20°)
<b>手指 grade( )</b>		予3	立 足関節の背屈 (5°)
1	座 連合反応	予4	位 膝関節の屈曲 (45°)
2	位 集団屈曲 不能・1/4以下・1/4~3/4・3/4以上	予5	位 股関節の外転 (20°)
3	集団伸展 不能・1/4以下・1/4~3/4・3/4以上	11	座 股関節の内旋(健 秒・患 秒)
4	手関節背屈 (3/4以上)	予6	立 足先で床を叩く
5	四指屈曲位での示指伸展 (3/4以上)	Barr's arm test (-・+・+) 前腕回内・肘屈曲 上肢下降・手指屈曲・第5指徴候	
6	MP伸展位でのIP屈曲 (3/4以上)	Barr's leg test (-・+・+)	
7	四指屈曲位での示指伸展 (背臥位)(3/4以上)	握力(健 kg・患 kg) 三角布(-・+・+)	
8	四指屈曲位での小指伸展 (背臥位)(3/4以上)	上肢総合評価:	
9	スピードテスト(健 秒・患 秒)	廃用手・補助手(C・B・A)・実用手(B・A)	

日常生活動作評価(ADL)

	完全自立	修正自立	近位監視	遠位監視	部分介助	全介助
殿部の持ち上げ						
寝返り ベット柵						
寝返り 自力						
座位保持 ベット柵						
座位保持 健手でベット面を押す						
座位保持 自力						
車いすへの移乗						
車いすでの移動						
起立 平行棒: 台の高さ( )cm						
起立 自力: 台の高さ( )cm						
立位保持(平行棒)						
立位保持(自力)						
膝立ち保持						
床からの立ち上がり						
しゃがみ立ち上がり						
入浴動作						
食事動作						
	はし・スプーン 臥位・ベット座位・車いす・椅子					
トイレ動作						
	おむつ・便器・尿器・ポータブル便器・洋式トイレ・和式トイレ					
更衣動作(上衣)						
更衣動作(下衣)						
靴の着脱						
歩行	平行棒内・外 : 不能・介助・監視・自立 補装具(-・+): KAFO・膝・AFO 杖(-・+): 四点・ロフストランド・T字 歩行様式 : 常時二点・二点一点・不規則 後型・揃型・前型 速度10m( )秒					
車いす	自走(屋外)・自走(屋内)・部分介助・完全介助・その他( )					
階段昇降	一足一段支持なし 一足一段支持あり 二足一段支持なし 二足一段支持あり 監視( ) 部分介助 完全介助					
片脚立位	右	開眼: 30秒以上可能 監視( ) 不可能	閉眼: 30秒以上可能 監視( ) 不可能	左	開眼: 30秒以上可能 監視( ) 不可能	閉眼: 30秒以上可能 監視( ) 不可能
歩容: 異常パターン(-・+)	つま先接地・内反・全足底接地		尖足・足引きずり・ホイップ(内・外)			
	膝折れ・反張膝・ロック膝		膝のこわばり・過度の屈曲			
	股外旋・トレンデレンブルグ・かま状		分まわし・骨盤挙上			
全体としての自立度:	全介助・ベット生活・屋内歩行・屋外歩行					